



Per maggiori informazioni:



Le malattie: quando rientro a scuola?

Sindrome mano-bocca-piede, stomatite vescicolare – Assenza di vescicole con salivazione abbondante.

Scabbia – pediculosi – Inizio del primo ciclo di trattamento da almeno 24 ore.

Malattie esantematiche – I tempi di riammissione variano dalla malattia. Quinta e sesta malattia non necessitano di periodo minimo di allontanamento.



Sintomi di sospetta malattia virale – Se il pediatra dà parere favorevole alla frequentazione, il bambino può rientrare.

Febbre – Assenza di febbre da almeno 24 ore (naturalmente sfebbrato, senza effetto di medicinali).

Faringite streptococcica (placche) – Inizio del trattamento antibiotico da 48 ore e assenza di febbre da 24 ore.

Tosse persistente con difficoltà respiratoria – Quando la tosse non impedisce di partecipare adeguatamente alle attività. È importante che sia stato consultato il pediatra.

Scariche di feci liquide in numero superiore a 3 – Assenza di scariche da 48 ore.

Vomito (2 o più episodi nelle 24 ore) – Assenza di vomito da 48 ore.

Congiuntivite purulenta – Inizio del trattamento antibiotico da almeno 24 ore.



In accordo con il Dipartimento di Prevenzione di AsFO si richiede ai genitori di **non portare** la/il bambina/o in comunità scolastica in caso di:

- condizioni generali compromesse tali da non permettere la partecipazione attiva della/del bambina/o;
- febbre superiore ai 37,5°;
- sintomi di sospetto di malattia virale.



Dopo una malattia, è preferibile che il bambino resti qualche giorno a casa in convalescenza, tornando gradualmente alle sue attività normali, per non compromettere il suo benessere e prevenire una ricaduta con dei sintomi più gravi.